

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《止瀉薬》

下痢・食あたり・軟便に

第2類医薬品

## 新第一赤玉はら薬

### 特徴

新第一赤玉はら薬は、下痢止めや整腸薬として使用されているセンブリ末、ゲンノショウコ末など4種類の和漢生薬に、下痢でお腹が痛い時に効果のあるロートエキス散を配合した下痢止め薬です。下痢、食あたり、腹痛を伴う下痢等に効果をあらわします。

### ⚠ 使用上の注意

#### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1.本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

胃腸鎮痛鎮痙薬、ロートエキスを含有する他の胃腸薬、乗物酔い薬

2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

3.授乳中の方は服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください

(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。)

#### 🗨️ 相談すること

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人。
- (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (4)高齢者。
- (5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6)次の症状のある人。 排尿困難
- (7)次の診断を受けた人。 心臓病、緑内障

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
□のかわき、目のかすみ

4.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

#### その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。

裏面もよくご覧ください。

## 効能・効果

下痢、消化不良による下痢、食あたり、はき下し、水あたり、くだり腹、軟便、腹痛を伴う下痢

## 用法・用量

次の1回量を、1日3回を限度として服用してください。  
服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
15才以上	18丸(1包)	3回
11才以上15才未満	12丸	
8才以上11才未満	9丸	
5才以上8才未満	6丸	
5才未満	服用しないでください	

## 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量

新第一赤玉はら薬は、1日量54丸中に次の成分を含んでいます。

成分	54丸中	成分	54丸中
オウバク末	720mg	センブリ末	30mg
オウレン末	150mg	ロートエキス散	300mg
ゲンノショウコ末	480mg	(ロートエキス)	30mg)

添加物として、バレイショデンプン、デヒドロ酢酸Na、乳糖、寒梅粉、アラビアゴム、炭酸Ca、タルク、酸化チタン、ゼラチン、赤色102号及び黄色5号を含有します。

## 保管及び取扱い上の注意


- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5)使用期限(ケースに記載)を過ぎた製品は、服用しないでください。

——問い合わせ先(お客様相談係)——

電話番号：076-431-8863 [テイカ製薬(株)]  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製造販売元

 **テイカ製薬株式会社**  
富山市荒川一丁目3番27号