

服用する前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう保管してください。

ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤

**アリモイド<sup>®</sup>100**

第3類医薬品

眼精疲労、肩こり、腰痛の症状緩和に

アリモイド100は

- ビタミンB<sub>1</sub>誘導体オクトチアミンが主成分で、腸管からよく吸収され、オクトチアミンは体内で役立つ型のビタミンB<sub>1</sub>とチオクト酸となって作用します。
- 本剤にはオクトチアミンと共に配合したビタミンB<sub>2</sub>・B<sub>6</sub>、ニコチン酸アミドを含み、眼精疲労、肩こり、腰痛などの症状を緩和するビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤です。



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことのある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹
消化器	吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
軟便、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

1. 次の諸症状の緩和  
神経痛、筋肉痛・関節痛（腰痛、肩こり、五十肩など）、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
2. 脚気  
「ただし、1及び2の症状について、1ヵ月ほど服用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
3. 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

（裏面につづきます）

## 用法・用量

次の量を水又は白湯で服用してください。

年齢	1回服用量(錠)	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	1回
7歳以上15歳未満	1錠	
7歳未満	服用しないこと	

### 《用法・用量に関する注意》

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2)用法・用量を厳守してください。

## 成分・分量

黄色の糖衣錠で、次の成分を含んでいます。

成分	2錠中
オクトチアミン(ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	100mg
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB <sub>6</sub> )	20mg
リボフラビン(ビタミンB <sub>2</sub> )	10mg
ニコチン酸アミド	24mg

添加物として、乳糖水和物、CMC-Ca、ゼラチン、ステアリン酸Mg、セラック、ヒマシ油、ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、タルク、アラビアゴム、炭酸Ca、酸化チタン、白糖、黄色4号(タートラジン)、カルナウバロウを含有しています。

### 《成分に関する注意》

本剤に配合されているビタミンB<sub>2</sub>により、尿が黄色になることがあります。

## 保管及び取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓し、箱に入れて保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5)ビンの中の乾燥剤は服用しないでください。

問い合わせ先(お客様相談係)

電話番号：076-431-8863[テイカ製薬(株)]  
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

 **テイカ製薬株式会社**

富山市荒川一丁目3番27号