

ご使用に際してこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

《ビタミンB₁主薬製剤》

第3類医薬品

神経痛、関節痛、筋肉痛

ソクツー

特長

「ソクツー」は、コンドロイチン硫酸エステルナトリウムをはじめビタミンB₁、ビタミンEを配合した錠剤で、次の特長を有しています。また、緩衝剤として塩酸グルコサミン1000mgを配合しています。

- 関節の痛みに直接働きかけるコンドロイチン硫酸エステルナトリウム
関節軟骨内などに多く存在し、関節に弾力性を与え、関節部の円滑な動きを助ける働きにより、関節の痛みを和らげます。
- 神経・筋肉系に作用するビタミンB₁
神経や筋肉のスムーズな働きを助け、傷害された末梢神経の修復に役立ち、関節痛、神経痛、筋肉痛などの症状に効果的に働きます。
- 血行を良くし新陳代謝を高めるビタミンE
自律神経を調整して毛細血管を拡張させ、毛細血管の血行を高めることで手足のしびれや冷えが改善され、新陳代謝も活発になり、つらい症状や疲れをほぐしてくれます。
- 服用しやすい小型の錠剤です。



使用上の注意



相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

軟便、下痢

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

- 次の諸症状の緩和：神経痛、筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、手足のしびれ、便秘、眼精疲労
- 脚気
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB₁の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時
裏面もよくご覧ください。

用法・用量

次の1回量を1日3回、食後に服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	3錠	3回
15才未満	服用しないでください	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

成分・分量


ソクツーは、淡黄色のフィルムコーティング錠で、大人1日量9錠中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	800mg
チアミン硝酸物（ビタミンB ₁ ）	30mg
ビタミンEコハク酸エステルカルシウム （トコフェロールコハク酸エステルカルシウム） （コハク酸dl- α -トコフェロールとして	103.58mg 100mg)

添加物として、塩酸グルコサミン、セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースCa、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、ヒプロメロース、タルク、酸化チタン及び三酸化鉄を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で薬が変質することがありますので、服用の都度フタをよくしめてください。
- (5)本剤をぬれた手でさわらないでください。湿気で薬が変質することがあります。
- (6)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (7)ビンの中に乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (8)ケースの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。
- (9)使用期限（ラベルとケースに記載）を過ぎた製品は、服用しないでください。



問い合わせ先（お客様相談係）

電話番号：076-431-8863【テイカ製薬（株）】

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造販売元

テイカ製薬株式会社

富山市荒川一丁目3番27号