

販売名：リキポリンD

第3類医薬品

【成分・分量】(100mL中)

チアミン硝化物…10mg、ピリドキシン塩酸塩…10mg、ニコチン酸アミド…25mg、タウリン…1000mg、無水カフェイン…50mg、ゴオウチンキ…0.2mL(原生薬換算量2.0mg)

(アルコール含有0.22mL以下)

添加物：クエン酸、白糖、エタノール、安息香酸Na、パラベン、黄色4号(タートラジン)、香料

◎本品は生薬成分も含まれるので、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には影響ありません。よく振ってから服用してください。

【効能・効果】

○滋養強壮 ○虚弱体質
○肉体疲労・病中病後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

【用法・用量】

大人(15才以上)1日1回1びん(100mL)服用◎15才未満は服用しないでください。
◎用法・用量を厳守してください。

ガラス:びん 金属:キャップ

T-250



富山のくすり

100mL

リキポリン[®]D

滋養強壮・虚弱体質

第3類医薬品

製造販売元

TS テイカ製薬株式会社

富山市荒川一丁目3番27号

【使用上の注意】

【相談すること】1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚:発疹・発赤 消化器:吐き気、嘔吐、胃部不快感、軟便、下痢、便秘 3.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4)使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。

お客様相談係 076-431-8863(テイカ製薬(株))

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

使用
期限

(西暦年月)

製造
番号